肌内注射评分标准

| 项目 | | | 分值 | 扣分 | 备注 |
|------|-------------|-------------------------|--|----|--------|
| 评估 | 服装鞋帽整洁, | 头发着装符合要求,仪表大方,举止端庄 | 3 | | |
| 3分 | | | | | |
| 操作 | 核对医嘱 ● | 核对医嘱、治疗单(双人) | 3 | | |
| 前 | 评估病人 ● | 核对病人床号、姓名、腕带 | 2 | | |
| 准备 | • | 解释目的、配合技巧等,征得同意 | 2 | | |
| 17分 | • | 评估病情、年龄、意识、用药史、过敏史、 | | | |
| | | 注射部位等 | 2 | | |
| | 环境准备 ● | 温度、光线适宜、安静整洁,能保护隐私 | 2 | | |
| | 护士准备 ● | 修剪指甲、洗手(七步)、戴口罩 | 2 | | |
| | 物品准备 ● | 物品准备齐全,摆放合理美观 | 4 | | |
| 操作 | 核对药物 ● | 核对药物标签(药名、浓度、剂量、用法、 | 3 | | |
| 步骤 | (双人) | 使用时间、有效期) | | | |
| | • | 检查药物质量(包装无破损、无变质) | 3 | | |
| 70 | 准备药液 ● | 准备无菌治疗盘 | 2 | | |
| | • | 锯安瓿颈部(或开启瓶口),消毒 | 2 | | |
| 分 | • | 检查一次性注射器(包装无破损、在有效 | 2 | | |
| | | 期内) | | | |
| | | 正确抽吸药液,排气 | 6 | | |
| | | 更换针头(或回套针帽) | 2 2 | | |
| | 拉动规双 | 再次核对注射单 核对病人床号、姓名、腕带 | 2 | | |
| | 核对解释 ● | 解释肌内注射目的并取得合作 | $\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$ | | |
| | 摆好体位 ● | 注意遮挡病人 | 2 | | |
| | 接好神也 ● | 在思题 | $\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$ | | |
| | 注射定位 ● | 臀大肌、臀中小肌定位法 | 5 | | |
| | 消毒皮肤● | 螺旋式由内向外消毒,直径>5cm,待干 | 2 | | |
| | 再次核对 ● | 进针前再次核对,检查排尽注射器内空气 | 4 | | |
| | 进针推药 ● | 准备按压棉签,绷紧皮肤,迅速垂直进针, | 6 | | |
| | VI 11 1E 29 | 深度 $1/2 \sim 2/3$ | | | |
| | • | 抽动活塞确定无回血后推药,速度适宜 | 6 | | |
| | • | 注意观察病人局部和全身反应 | 2 | | |
| | 拔针按压 ● | 快速拔针,用无菌干棉签按压至不出血 | 4 | | |
| | 再次核对 ● | 再次核对,确认无误 | 2 | | |
| | 整理交代 ● | 协助病人取舒适体位,整理衣服和床单位 | 2 | | |
| | • | 询问需要,交代注意事项,致谢 | 2 | | |
| | 清理用物 ● | 规范分类,正确处理用物 | 2 | | |
| | 洗手记录 ● | 洗手(七步),在注射单上签名,记录 | 3 | | |
| 综合 | 熟练程度 ● | 程序正确、动作规范、熟练,查对及无菌 | 5 | | |
| 评价 | | 观念强 | | | |
| 10分 | 人文关怀 ● | 语言流畅,态度和蔼,沟通有效,解释到 | 5 | | |
| • /• | | 位,指导正确,关心体贴病人 | | | |
| | 总分 | | 1 | | |
| | - / • | | | | |

附: 完成时间 10 分钟, 超时 1 分钟扣 2 分, 并停止操作。