



上节复习--知识点:

◆第十章 心血管系统常见疾病



重点--知识点:

- ◆ 高血压的临床表现、药物治疗



(四) 治疗要点

- ◆ 降压目标：
- ◆ 一般人群、糖尿病、肾病、心力衰竭患者降至
???/???mmhg以下
- ◆ 老年患者降至???/???mmhg以下



(2) 药物治疗

- ◆ ①剂量 小→大
- ◆ ②优选长效制剂，平稳
- ◆ ③联合用药，疗效不佳时
- ◆ ④个体化用药



降压药的联合应用P249

- ◆ I、ACEI或ARB + 噻嗪类利尿剂
- ◆ II、ACEI或ARB + D-CCB（地平）
- ◆ III、D-CCB + 噻嗪类利尿剂
- ◆



- ◆ IV、D-CCB + β 受体阻滞剂
- ◆ V、三药联合的方案：
 - ◆ D-CCB + ACEI（或ARB）+ 噻嗪类**最为常用**。
- ◆ VI、四药联合的方案（三药联合+第四种药物）
 β 受体阻断剂、螺内酯、可乐定或 α 受体阻断剂



特殊人群的降压治疗

- ◆ 1、老年人：
- ◆ 可选用：**CCB、ACEI、ARB**以及利尿剂或 β 受体阻断剂
- ◆ 不用：利血平、可乐定等中枢降压药



◆ 2、儿童青少年

◆ 1) ACEI、ARB、CCB作为首选

◆ 2) 利尿剂、 β 受体阻断剂、 α 受体阻断剂用于严重
高血压联合用药



- ◆ 3、妊娠高血压
- ◆ 禁用：ACEI或ARB
- ◆ 常用的有硫酸镁、甲基多巴、拉贝洛尔、美托洛尔、氢氯噻嗪及硝苯地平；



课堂练习

- ◆ 请写出三个治疗妊娠期高血压的常用药物通用名？



◆ 第十一章 神经系统常见疾病




● 学习目标

- 重点难点
- 授课内容
- 拓展链接
- 学习小结

● 掌握

● 癫痫的临床表现、药物治疗
● 消化性溃疡的临床表现、药物治疗



重点

癫痫的药物治疗
消化性溃疡的药物治疗

难点

癫痫的药物治疗
消化性溃疡的药物治疗



◆第十一章 神经系统常见疾病

◆第三节 癫痫



Epilepsy

羊癲瘋發作



全身抽搐 口吐白沫，就是羊癲瘋



抗癫痫药物的选择及治疗原则

◆ 常用药物：

◆ ①一线抗癫痫药物：卡马西平、丙戊酸钠、苯妥英钠等

◆ ②二线抗癫痫药物：奥卡西平、托吡酯、拉莫三嗪、左乙拉西坦等。



治疗原则

◆ 1、根据发作类型选药：

◆ ①局灶性发作：

◆ 卡马西平、丙戊酸钠、托吡酯、拉莫三嗪、左乙拉西坦

◆ ②全面性发作：

◆ 卡马西平、丙戊酸钠、托吡酯、拉莫三嗪、左乙拉西坦、苯巴比妥、苯妥英钠



- ◆ 其它选药原则：
个体化、小剂量、长期规律用药、定期随访




◆第十二章 消化系统常见疾病

◆第二节 消化性溃疡



发生在胃或十二指肠，分别称为胃溃疡(GU)或十二指肠溃疡(DU)。





(三) 临床表现

一、典型症状

上腹痛为主要症状

- 1、慢性病程：数年至数十年
- 2、复发性：秋冬、冬春



◆ 3、节律性:

◆ 十二指肠溃疡: 饥饿痛、夜间痛、清晨痛

◆ 胃溃疡: 餐后痛





- ◆ 二、不典型表现：
- ◆ 腹胀、灼热、恶心



四、并发症

- ◆ 出血
- ◆ 穿孔
- ◆ 幽门梗阻
- ◆ 癌变



六、治疗

一般治疗

- 规则饮食
- 戒烟、酒
- 避免服用NSAIDs药物

药物治疗

- 胃酸
 - 中和胃酸
 - 抑制胃酸分泌
- 胃粘膜保护剂
- H. pylori根治



(二) 药物治疗

- ◆ 1.根除Hp治疗:
- ◆ 一线方案:
- ◆ 四联疗法= PPI+克拉+铋剂+阿莫（甲硝唑）
疗程：7~14天。
- ◆ P310表



- ◆ 2.抑制胃酸治疗（表12-3）
- ◆ 常规抑酸治疗：**PPI**早餐前1次，**H2RA**晚餐后1次
- ◆ 维持抑酸治疗：**H2RA**晚餐后1次



◆ 3.抗酸药及胃黏膜保护剂

◆ 腹痛时按需服用、临时服用



学习小结

- ◆ 癫痫的临床表现、药物治疗
- ◆ 消化性溃疡的临床表现、药物治疗



Thanks